

13价肺炎球菌疫苗

香港资产管理区域 2018-10-09

PMDHK旧贴文：2017年10月30日

13价肺炎球菌疫苗是目前保护率最高的肺炎球菌疫苗，13价疫苗额外加入3种血清型肺炎球菌导致的入侵性疾病抗体，适合出生后6星期、2、4、6、12个月及5岁的婴幼儿接种一针。

若在2岁或以上人士未曾注射肺炎球菌疫苗，亦可补打一针，覆盖率高达90%。

肺炎球菌可经由飞沫或呼吸道分泌物传染，是由肺炎球菌引致的疾病，该细菌共有逾90种血清类型，此细菌可引致严重疾病包括肺炎、脑膜炎及中耳炎等。

★已有超过103个国家(如英国、美国、法国等等) 将13价疫苗纳入国家儿童疫苗计划之指定疫苗。



恶菌抗药增加，入侵性疾病元凶

肺炎球菌可分为多种血清型，部份侵略性较高的血清型或会引起较多并发症，加上肺炎球菌抗药性亦在增加，令治疗更加困难。

血清型3

可引致严重肺炎，亦与溶血性尿毒症息息相关。

血清型6A

抗药性上升，对一般治疗反应不佳，并会导致严重肺炎。

血清型19A

具抗药性，并会导致严重的肺炎球菌疾病。亦与溶血性尿毒症息息相关。

★ 旧一代疫苗不足以应付恶菌

众所周知，接种疫苗可预防肺炎球菌疾病。

根据卫生防护中心2015年数据显示，旧一代的肺炎球菌疫苗的覆盖率已跌至不足一成。由此可见旧一代疫苗覆盖的肺炎球菌血清型已经不足以应付现时流行的血清型。”

疫苗

覆盖率

13价疫苗 84.2%

10价疫苗 5.3%

7价疫苗 5.3%

★ 婴幼儿属高危一族



细菌可透过飞沫和身体接触互相传染病菌、增加感染肺炎球菌和其他病菌的机会。

香港儿童鼻腔带菌率:

2-3岁 28.8%

4岁 32.6%

5岁 20.1%

6岁 15.2%

13价疫苗有效预防13种血清型引起的入侵性疾病

对5岁或以下儿童发病率减少89%

对5-17岁儿童发病率减少68%

保护父母 保护孩子 及早接种13价疫苗

预防肺炎球菌疾病，请即向医生查询

★ 注意事项

接种疫苗前请留意

- 怀孕期、哺乳期的妇女及对白喉类疫苗过敏人士不宜接种肺炎球菌疫苗
- 高烧及严重身体不适者不宜接种疫苗，病愈后才可接种

轻微副作用一般只会维持1 - 2天

约10%人有以下反应:

- 接种位置: 轻微红肿、注射部位疼痛、手臂活动受限
- 其他: 发烧、食欲下降、头痛、腹泻、畏寒、疲劳、关节痛

资料来源: 君医



保值增值 子女传承 健康养老 规避风险

关注: 点解右上解选择“查看公众号”或扫描左侧二维码进行关注
分享: 点解右上解选择“发送给朋友”或“分享到朋友圈”

香港财富咨询顾问区域有限公司
Portfolio Management District (HK) Limited

香港财富咨询顾问区域有限公司平台(本微信平台)所载内容为本公司编制,仅作参考用途,不保证所提供提讯的准确性和完整性。本平台内容仅供学习交流,并不构成在任何地区、国家向任何人发出的推荐或邀约。对构成任何人使用本资讯内容所引致的任何直接或间接损失均不承担任何法律责任。