


## 1 前言

「三高」，即高血糖、高血壓及高膽固醇，是香港普遍的都市病。治療「三高」的醫療費用所費不菲，若患上這些長期疾病後，患者往往難以取得保險保障，只能默默承受日漸劇增的龐大醫療開支。但是，如果患者因此而忽視治療，將有可能引發多種致命危疾，對健康造成嚴重影響。

## 60 糖尿病



## 60 高血壓及高血壓

- 是 **中風、冠心病** 等病症的主要起因

## 2 都市三寶特點

### 三合一保障

「都市三保」/「都市三保明珠」醫療危疾保障系列涵蓋 **醫療**、**危疾** 及 **人壽** 保障。

此計劃可作為基本計劃或附加契約，靈活方便！

## 3 審批注意事項

絕大部份情況下，受保人 **需進行檢**。

### 主要核保因素

- 投保年齡
- 糖尿病 / 高血壓 / 高血脂狀況
- 患糖尿病的年期
- 體脂比例
- 已患上或曾經患上的其他疾病

越年輕患上「三高」及患上「三高」之年期越長，核保越嚴謹。

《詳情見受保例子》

若同時患上糖尿病、高血壓及高膽固醇，患上心血管疾病的風險更較一般人高 **20倍**。



此產品專為 **糖尿病患者** 或 **「三高」人士** 而設。若準戶只患上高血壓及/或高血脂，現有醫療/危疾產品亦有可能受保，但可能需繳付額外附加保費 (loadings)



**必須同時投保  
「危疾」及「醫療」部份**



## 受保例子

(以下均為服務後指數)



### 請注意：

糖化血色素(HbA1c)需抽血檢查，有別於針刺手指的血糖檢查。

## 情景 1 準客戶： 48歲，男性，非吸煙，體脂比例(BMI) 為30

### 只有糖尿病

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 10.0%
- 血壓：正常但偏高
  - 138/85 mmHg
- 血脂值：正常
  - 總膽固醇為 5.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 2.0mmol/l

並沒有其他病症



### 糖尿病 + 高血壓

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 10.0%
- 高血壓
  - 155/94 mmHg
- 血脂值：正常
  - 總膽固醇為 5.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 2.0mmol/l

並沒有其他病症



糖化血色素高達10%時，仍有機會受保，但若同時患上高血壓，我們對血壓讀數的要求將相對嚴謹。

## 情景 2 準客戶： 48歲，男性，非吸煙，體脂比例(BMI) 為30

### 糖尿病 + 高血壓

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 8.2%
- 高血壓
  - 155/94 mmHg
- 血脂值：正常
  - 總膽固醇為 5.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 2.0mmol/l

並沒有其他病症



### 糖尿病 + 高血壓

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 8.2%
- 高血壓
  - 165/96 mmHg
- 血脂值：正常
  - 總膽固醇為 5.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 2.0mmol/l

並沒有其他病症



與情景1比較，情景2準客戶的糖化血色素相對較低(只有8.2%)，所以我們對血壓讀數的要求亦相對寬鬆。

## 情景 3 準客戶： 48歲，男性，非吸煙，體脂比例(BMI) 為30

### 只有糖尿病

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 10.0%
- 血壓：正常但偏高
  - 138/85 mmHg
- 血脂值：正常
  - 總膽固醇為 5.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 2.0mmol/l

並沒有其他病症



### 糖尿病 + 高血脂

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 10.0%
- 血壓：正常但偏高
  - 138/85 mmHg
- 高血脂
  - 總膽固醇為 8.8 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 5.0mmol/l

並沒有其他病症



與情景1類似，糖化血色素高達10%時，仍有機會受保，但若同時患上高血脂，我們對血脂指數的要求將相對嚴謹。



## 受保例子

(以下均為服務後指數)



### 請注意：

糖化血色素(HbA1c)需抽血檢查，有別於針刺手指的血糖檢查。

## 情景 4 準客戶：48歲，男性，非吸煙，體脂比例(BMI)為30

### 糖尿病 + 高血脂

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 8.2%
- 血壓：正常但偏高
  - 138/85 mmHg
- 高血脂
  - 總膽固醇為 8.8 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.3 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 5.0mmol/l

並沒有其他病症



### 糖尿病 + 高血脂

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 8.2%
- 血壓：正常但偏高
  - 138/85 mmHg
- 高血脂
  - 總膽固醇為 9.5 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.2 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 6.0mmol/l

並沒有其他病症



與情景3比較，情景4準客戶的糖化血色素相對較低(只有8.2%)，所以我們對血脂指數的要求亦相對寬鬆。

## 情景 5 準客戶：48歲，男性，非吸煙，體脂比例(BMI)為30

### 糖尿病 + 高血壓 + 高血脂

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 9.0%
- 高血壓
  - 145/92 mmHg
- 高血脂
  - 總膽固醇為 7.2 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.2 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 4.0mmol/l

並沒有其他病症



### 糖尿病 + 高血壓 + 高血脂

- 2型糖尿病、沒有使用胰島素
  - 8年病史，糖化血色素為 9.0%
- 高血壓
  - 150/93 mmHg
- 高血脂
  - 總膽固醇為 8.0 mmol/l
  - 高密度膽固醇為 1.2 mmol/l
  - 三酸甘油脂為 4.5mmol/l

並沒有其他病症



若準客戶同時患上「3高」及糖化血色素相對較高(9%)時，我們對血壓讀數及血脂指數的要求將相對嚴謹。

### 瞭解詳情

(852) 3101 6500

[pmdhk.com.hk](http://pmdhk.com.hk)

PMDHK

YouTube PMDHK



立即關注 WeChat ID:  
 PMD\_HK